



CEBO PARA CARACOLES Y BABOSAS AL 4%

Tecnología de tasa reducida

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN:

Consulte el panel lateral para observar las declaraciones adicionales de precaución.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Peligroso para seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN:

Es perjudicial si se ingiere o se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese cuidadosamente con jabón y agua después de utilizarlo y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, fumar tabaco y usar el baño. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarlo. El contacto con la piel que se repite con frecuencia y por tiempo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas. **IMPORTANTE:** Mantenga los gránulos alejados de los niños y las mascotas. El cebo puede ser atractivo para los perros. Encierre a las mascotas durante la aplicación para evitar que crean que los están alimentando.

PRIMEROS AUXILIOS: Conserve el contenedor o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de veneno o al médico, o vaya a realizarse un tratamiento.

Si lo tiene en la piel: Quítese la ropa contaminada. Enjuáguese la piel de inmediato con mucha agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un doctor para que le aconsejen un tratamiento.

En caso de ingestión: Llame a un centro de control de envenenamiento o a un doctor de manera inmediata para que le aconsejen un tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua. No intente vomitar a menos que se lo indique el centro de control de envenenamiento o el médico. No le ofrezca nada para ingerir por la boca a una persona inconsciente.

Observación para el médico: no hay disponible ningún antídoto. Trate al paciente con síntomas.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE): Las personas a cargo de la aplicación y manipulación deben utilizar camisas de mangas largas, pantalones largos, zapatos con medias y guantes resistentes a químicos hechos con material a prueba de agua como el polietileno y el cloruro de polivinilo. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar/mantener el PPE. Si no hay instrucciones para las prendas lavables, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE por separado de la ropa para lavar.

PELIGROS AMBIENTALES: No aplique directamente al agua, en las áreas donde hay agua superficial o en las áreas entre mareas por debajo de la marca promedio más alta de agua. No contamine el agua cuando elimina el equipo para lavarlo con agua.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, la comida o alimentos con el almacenamiento o eliminación.

ALMACENAMIENTO: Almacene el producto en el contenedor con la etiqueta original en un lugar fresco, seco y bajo llave lejos del alcance de los niños. Mantenga el contenedor bien cerrado cuando no está en uso. No almacene directamente al sol.

DESECHO: Los desechos que se producen por el uso de este producto se pueden desechar en el lugar o en una instalación aprobada de desechos de agua.

ELIMINACIÓN DEL CONTENEDOR: Elimine los contenedores vacíos en un vertedero sanitario, por medio de la incineración, o por medio de la quema, si está permitido por las autoridades locales y estatales. Si lo quema, aléjese del humo.

GARANTÍA: En la medida que sea consistente con la ley vigente, el vendedor no emite garantía, expresa o implícita, sobre el uso de este producto que no sea la indicada en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos de uso y/o manipulación del material cuando dicho uso y/o manipulación vaya en contra de las instrucciones de la etiqueta*.

Meta™ es una marca comercial registrada de Lonza AG, Suiza.

N.º de inscripción EPA 7173-257

N.º Est. EPA 74926-FRA-1



Para el control de babosas y caracoles en terrenos y elementos ornamentales, cultivos de campo, tabaco, cultivo de semillas, verduras, cultivos de árboles y pequeñas frutas

Ingrediente activo:

Metaldehído	
2,4,6,8-tetrametilo-1,3,5,7-tetraoxociclo octano	4,0%
Ingredientes inertes	96,0%
Total	100,0%

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto sin respetar las indicaciones de su etiqueta es una violación a la ley. En caso de requisitos por parte de su estado o tribu, puede consultar a la agencia responsable de las regulaciones de pesticidas. No aplique este producto de una manera que pueda entrar en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea en forma directa o a través de desplazamiento. Sólo los manipuladores protegidos pueden permanecer en el área durante la aplicación.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA: Utilice este producto únicamente según su etiqueta y de acuerdo con la Norma de Protección de Trabajadores, 40 del Código de Reglamentos Federales (CFR), Artículo 70. Esta norma contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en zanjas, bosques, viveros, invernaderos y manipuladores de pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos de capacitación, desinfección, notificación y asistencia de emergencia. Contiene instrucciones específicas y excepciones relacionadas con las declaraciones en esta etiqueta sobre el equipo de protección personal (PPE) y el período de entrada restringida.

No ingresar ni permitir la entrada a trabajadores en las áreas de tratamiento durante el período de entrada restringida (REI) de 12 horas. El PPE obligatorio para la entrada temprana a las áreas de tratamiento que está permitido por las Normas de protección de trabajadores y que incluye el contacto con cualquier material que ha sido tratado, como las plantas, el suelo o el agua, es: camisas de mangas largas, pantalones largos, zapatos con medias y guantes resistentes a químicos hechos con material impermeable.

REQUISITOS DE USO NO AGRÍCOLA: Estos requisitos se aplican para los usos de este producto que NO entran dentro del alcance de la Norma de protección de trabajadores para los pesticidas agrícolas (40 CFR, Artículo 70). La WPS se aplica cuando se utiliza este producto para producir plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

DIRECTIVAS DE APLICACIÓN

Aplique sobre la superficie del suelo. Los gránulos se pueden difundir con equipos de aire o por suelo a menos que se especifique lo contrario en la etiqueta. Utilice un tratamiento de banda entre las hileras después de la formación de partes de cultivo comestible. No contamine partes comestibles.

Los mejores resultados se obtienen si se aplican de noche, después del riego o la lluvia. No riegue 48 horas después de su aplicación. Aplique cuando aparece por primera vez el daño a la planta. Repita cada 2 a 4 semanas o cuando aparece nuevamente la infección. La mayoría de las plantas toleran el Metarex. Sobre cualquier planta conocida o que se sospecha que es sensible a los químicos para protección de plantas, el usuario debe realizar una aplicación de prueba para determinar la sensibilidad de la planta a este producto antes de usarlo a gran escala o antes de que se realice un tratamiento de difusión. Si la prueba llegara a determinar que la planta es sensible a este producto, no lo aplique. Los gránulos de Metarex se pueden aplicar a los siguientes cultivos para controlar las babosas y los caracoles:

ÁREAS DONDE NO HAY CULTIVO tales como: Tierra no utilizada, zonas de barrera y áreas no agrícolas que no se cultivan; parques y áreas recreativas; campos de golf; malezas; ferrocarriles; tuberías; autopistas; servidumbre de paso de energía y teléfono; laterales del camino; depósitos de madera; áreas de almacenamiento; sitios industriales; áreas de estacionamiento; aeropuertos y áreas similares sin cultivo que se pueden infectar y le pueden ofrecer al transeúnte una acumulación de babosas y caracoles. Aplique de 5 a 40 libras por acre.

TERRENOS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES (invernaderos ornamentales, plantaciones ornamentales, viveros comerciales ornamentales, cubiertas de tierras, césped y pastos que crecen de la tierra fértil, de la dichondra y alrededor de una cimentación): Aplique de 3 onzas a una libra por cada 1.000 pies cuadrados (aproximadamente de 6 a 32 gránulos por pie cuadrado u 8 a 40 libras por acre).

ALCACHOFAS (por aire o tierra antes de la etapa del brote tallado o por tierra únicamente): Aplique de 9 a 40 libras por acre.

CULTIVOS DE CAMPO (granos de cereal, maíz, legumbres y menta): Aplique de 5 a 40 libras por acre.

CULTIVOS DE SEMILLAS (remolacha, flores, césped, cultivos de verduras y legumbres que crecen de semillas): Aplique de 5 a 40 libras por acre.

FRUTAS PEQUEÑAS (zarcamoras, arándanos azules, tipo de bayas negras, arándanos rojos, moras de Logan, frambuesas, frutillas y uvas): Aplique de 6,5 a 40 libras por acre ó 2,5 onzas hasta una libra por cada 1000 pies cuadrados ó 5-32 gránulos por pie cuadrado. Se puede aplicar en una banda circular (no menos de 6 pulgadas de ancho) alrededor de los tres troncos.

TABACO (campo, invernadero y casa de torno): Aplique de 5 a 40 libras por acre o una libra por cada 1.100 a 8.800 pies cuadrados.

CULTIVOS DE ÁRBOLES (cítricos, aguacates, cerezas, duraznos, damascos, manzanas, peras, bananas y papayas): Aplique de 6,5 a 40 libras por acre ó 2,5 onzas hasta una libra por cada 1.000 pies cuadrados ó 5-32 gránulos por pie cuadrado. Se puede aplicar en una banda circular (no menos de 6 pulgadas de ancho) alrededor de los tres troncos.

VERDURAS (espárragos, frijoles, remolacha, frijoles negros, brócoli, repolitos de Bruselas, repollo, calabacín, zanahorias, coliflor, apio, berzas, maíz, guisante pinto, pepinos, berenjenas, endivias, ajo, ginseng, rábano picante, col rizada, colinabo, puerro, legumbres, lechuga, melones, hojas de mostaza, quimbombó, cebolla, chirivía, arvejas, pimientos, papas, calabaza, rabanito, ruibarbo, colinabo, salsifí, cebolla escalonía, espínaca, zapallo, batatas, acelga, tomates, nabos y sandías): Aplique de 5 a 40 libras por acre. (31807)

Manufactured for:
Liphatech, Inc.
3600 W. Elm Street
Milwaukee, WI 53209
414-351-1476

17022-3 (08/2011)

LIPHATECH™

EL PODER ESTÁ EN EL GRÁNULO