

## PRECAUCIONES

Peligroso para personas y animales domésticos

**ADVERTENCIA:** Puede ser fatal si se ingiere. Lávese totalmente con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer o fumar. Este producto puede absorberse a través de la piel. Use una mascarilla y guantes al aplicar o manipular este producto. Manténgalo alejado de los seres humanos, animales domésticos o mascotas.

**PRIMEROS AUXILIOS** Tenga a mano esta etiqueta cuando pida asistencia para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para conseguir consejos para el tratamiento. Si puede tragar, haga que la persona beba un vaso de agua. No induzca vómitos a menos que un centro de toxicología o un doctor le indiquen que lo haga.

Si hay contacto con los ojos: Sostenga el ojo abierto y enjuague suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos, quítese los lentes de contacto, si los tiene puestos, y luego continúe enjuagando el ojo. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejo de tratamiento.

Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Enjuáguese la piel con agua fría abundante durante 15 a 20 minutos. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejos de tratamiento.

Si se inhala: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a la ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es posible. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejos de tratamiento.

Nota para el médico: Si se ingiere, administre Vitamina K1 intramuscular u oralmente, como se indica en las sobredosis de bishydroxycoumarin. Repita según sea necesario basándose en el control de los tiempos de protrombina.

**PELIGROS AMBIENTALES:** Este producto es tóxico para peces y animales salvajes. No aplique el producto directamente en el agua o en relleno donde haya agua en la superficie o en zonas comprendidas entre mareas por debajo de la marca promedio más alta del agua.

## ALMACENAMIENTO Y DESCARTE

No contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o descarte indebido.

Almacenamiento: Almacene en el recipiente original en un lugar fresco, seco e inaccesible a los niños y mascotas.

Descarte del plaguicida: Los desechos resultantes del uso de este producto pueden descartarse en el sitio o en una instalación aprobada para desechos. Descarte del envase: Descarte el envase vacío en un relleno sanitario o mediante incineración o, si lo permiten las autoridades estatales y locales, mediante quema. Si se quema, aléjese del humo.

**GARANTÍA:** El vendedor no da garantías, expresas ni implícitas, referentes al uso de este producto aparte de lo indicado en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos del uso y/o la manipulación de este material cuando dicho uso y/o manipulación sea contraria a las instrucciones de la etiqueta.

EPA Reg. No. 7173-113  
EPA Est. No. 7173-WI-1

FECHA 03/08

## PLAGUICIDA DE USO RESTRINGIDO DEBIDO A SU ALTA TOXICIDAD AGUDA

Para la venta al detalle y el uso de Aplicadores Certificados o personas bajo su supervisión directa y solamente aquellos usos cubiertos por el Certificado del Aplicador Acreditado.



rozol<sup>®</sup>

# POLVO DE RASTREO

PARA USAR SÓLO EN INTERIORES  
Y MADRIGUERAS QUE DAN AL INTERIOR DEL EDIFICIO

Ingrediente activo: chlorophacinone . . . . 0.2%  
Ingredientes inertes . . . . . 99.8%  
Total . . . . . 100.0%

## MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN:

Para ver precauciones adicionales consulte el panel lateral

**LIPHATECH<sup>®</sup>**

Liphatech, Inc.  
3600 W. Elm Street  
Milwaukee, WI 53209  
(414) 351-1476

## INSTRUCCIONES DE USO

Es una contravención de la ley federal usar este producto de manera contraria a las instrucciones de la etiqueta.

**RESTRICCIONES DE USO:** Se usa contra las ratas de Noruega, ratas de tejado y ratones domésticos dentro de casas, edificios industriales y agrícolas, además de estructuras fabricadas de tipo similar. El polvo de rastreo Rozol puede espolvorearse también en las madrigueras de ratas que se ubican a lo largo de la periferia de los edificios y que es probable que sirvan de vía de entrada a estas estructuras. El polvo de rastreo debe colocarse en puntos inaccesibles para niños, mascotas, animales domésticos o fauna salvaje. No ponga el cebo en áreas donde exista la posibilidad de contaminar alimentos o superficies que tomen contacto directo con ellos. No lo ponga cerca de aberturas de conductos de ventilación. Use sólo en los lugares, para las plagas y con los métodos de aplicación mencionados en esta etiqueta.

**SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO:** Determine las áreas secas donde sea más probable que las ratas y los ratones recojan el polvo en sus patas o pelajes y lo ingieran al asearse. En general, estas áreas están a lo largo de paredes, junto a aberturas y madrigueras, en rincones y lugares ocultos, entre espacios entre pisos y paredes, o en ubicaciones donde se hayan observado roedores o señales de su presencia. Retire los objetos apilados directamente sobre el piso y póngalos sobre bases de patines. Use cajas y otros obstáculos para forzar a los roedores a circular por las áreas restringidas. Preste especial atención a la capacidad trepadora de las ratas de tejado. Para esta especie, use una tubería adecuada de PVC, chapa, cartón o material rígido similar, fijada con firmeza a vigas u otras superficies horizontales por las que vayan a pasar las ratas. Utilice tubos de largo suficiente para reducir al mínimo el derrame de polvo por los extremos.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

**Para ratones domésticos** úselo a razón de 1 oz (28 g) de polvo por 2.5 pies cuadrados (0.23 m<sup>2</sup>) de pasadizo.

**Para ratas de Noruega y ratas de tejado** úselo a razón de 2 oz. (57 g) de polvo por 2.5 pies cuadrados (0.23 m<sup>2</sup>) de pasadizo.

Aplique el polvo en la madriguera del roedor o en los agujeros o dentro de paredes con un aplicador manual o algo similar. No use dispositivos automáticos para espolvorear. Espolvoree en partes de tal modo que los roedores queden expuestos al polvo. El tamaño del área espolvoreada puede ser (entre otros) 6 x 12 pulgadas (15 y 30 cm) y debe adaptarse a cada situación. En el caso de madrigueras ubicadas en la periferia de los edificios y que puedan servir de vías de entrada a estas estructuras, coloque alrededor de 5 gramos de polvo de rastreo en cada madriguera. Cierre las madrigueras con tierra, hojas sueltas o papel. Trate nuevamente si se vuelven a abrir las madrigueras.

Mantenga el polvo en las áreas tratadas por lo menos 20 días. Utilice guantes, recoja y deseche de inmediato todos los animales muertos que estén a la vista y el polvo usado.

Repita el tratamiento cuando se vuelva a producir la infestación. Donde haya una fuente continua de infestación, establezca portadores permanentes de polvo y reabastézcalos con polvo según sea necesario.

(02408)